


GINGKO



Zona óptima 
Zona de adaptación 

Fechas de siembra por zona

Subregiones	MAYO			JUNIO			JULIO			ACOSTO		
	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
15-16-14-13			■	■	■							
17				■	■	■						
2-7-1-8-9						■	■	■				
6-3						■	■	■	■			
4									■	■	■	
5-10								■	■	■		

Características varietales

Porte vegetativo	semierecto
Altura de planta	88 cm
Vuelco	resistente
Frío en pasto	susceptible
Capacidad de macollaje	media
Desgrane	resistente
Vernalización	sin requerimientos
Grupo de calidad	3 (muy buena calidad comercial con buenos valores de PH y proteína)
Respuesta a la fertilización	muy alta
Ciclo	corto

Densidad (plantas logradas por m²)



En fecha de siembra óptima: 320-360




En fecha de siembra límite: 360-380

Perfil Sanitario

Roya de la hoja



Roya del tallo




Roya amarilla



Drechslera



Septoria



Tizón bacteriano



Fusarium



 muy buen comportamiento
  intermedio -bueno
 intermedio
  intermedio-bajo
  susceptible

Ciclo corto de alto rendimiento y excelente adaptación ambiental.