



Zona  
óptima

## Fechas de siembra por zona

Subregiones	MAYO			JUNIO			JULIO			ACOSTO		
	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
17-15-16		■	■									
2-7			■	■	■							
6-3			■	■	■	■						
1			■	■	■							
4-5				■	■	■	■					
9-8-20			■	■	■							
10-26				■	■	■						

## Características varietales

Porte vegetativo	semierecto
Altura de planta	78 cm
Vuelco	resistente
Frío en pasto	susceptible
Capacidad de macollaje	alta
Desgrane	resistente
Vernalización	muy baja
Grupo de calidad	2
Respuesta a la fertilización	muy alta
Ciclo	intermedio-largo

## Densidad (plantas logradas por m<sup>2</sup>)



En fecha de siembra óptima: 280-300



En fecha de siembra límite: 300-320

## Perfil Sanitario

### Roya de la hoja



### Roya del tallo



### Roya amarilla



### Drechslera



### Septoria



### Tizón bacteriano



### Fusarium



■ muy buen comportamiento   
 ■ intermedio -bueno  
■ intermedio   
 ■ intermedio-bajo   
 ■ susceptible

# ARAZÁ

Nueva variedad de ciclo intermedio-largo adaptado a planteos de alta tecnología aprovechando el excelente potencial de rinde en gran parte del área triguera argentina.